

EL COMPLEJO *LONICERA PILOSA* (KUNTH) SPRENG.
(CAPRIFOLIACEAE)

JOSÉ Á. VILLARREAL-QUINTANILLA^{1,4} ALMA D. RUIZ-ACEVEDO¹, A. EDUARDO ESTRADA-CASTILLÓN³ Y DIANA JASSO DE RODRÍGUEZ²

¹Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Botánica,
Saltillo, Coahuila, México.

²Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de
Fitomejoramiento, Saltillo, Coahuila, México.

³Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales,
Linares, Nuevo León, México.

⁴Autor para la correspondencia: javillarreal00@hotmail.com

RESUMEN

Se revisa el complejo de *Lonicera pilosa* (Kunth) Spreng., formado por *Lonicera cerviculata*, *L. pilosa* var. *pilosa* y *L. pilosa* var. *glabra*. Se realizó un análisis de escalamiento multidimensional utilizando 38 caracteres morfológicos y 152 pliegos de herbario, encontrando que el complejo está formado por tres grupos, dos especies y una nueva variedad que aquí se propone.

Palabras clave: análisis multivariado, Caprifoliaceae, *Lonicera*.

ABSTRACT

The *Lonicera pilosa* (Kunth) Spreng complex, which consists of *Lonicera cerviculata*, *L. pilosa* var. *pilosa* and *L. pilosa* var. *glabra*, is reviewed. A multidimensional scaling analysis, using 38 morphological characters and 152 herbarium sheets, was applied. The complex is integrated by three groups, two species and a variety here proposed as new to science.

Key words: Caprifoliaceae, *Lonicera*, multivariate analysis.

INTRODUCCIÓN

El género *Lonicera* está formado por unas 150 especies agrupadas en una serie de secciones que, de acuerdo con Theis et al. (2008), no presentan monofilia. Se distribuye en regiones templadas y montañosas del Hemisferio Norte y muchos de sus elementos son cultivados como plantas de ornato. Este género diverso y complejo ha sido clasificado en dos subgéneros, cuatro secciones y 24 subsecciones, de las cuales cinco tienen representantes en México (subsec. *Purpurascentes*, *Distegiae*, *Longiflorae*, *Phenianthi* y *Cyhpeolae*) (Rehder, 1903). *Lonicera pilosa* fue descrita en 1818 como *Caprifolium pilosum* por Kunth. Es la especie del género con más amplia distribución en México (Villarreal-Quintanilla, 2000) y la más vistosa por sus inflorescencias colgantes, por su cáliz con un cuello corto a alargado y por sus flores largamente tubulares de color amarillo, anaranjado o anaranjado-rojizo. De acuerdo con la clasificación infragenérica de Rehder (1903), la especie se ubica en la sección *Phenianthi*, la cual originalmente incluye cinco especies (*L. arizonica*, *L. ciliosa*, *L. pilosa*, *L. sempervirens* y *L. subaequalis*), con flores actinomorfas o ligeramente bilabiadas, con tubo giboso o ventricoso, estambres insertos debajo de la parte media del tubo floral y el par de hojas superiores connadas. Dada su amplia distribución, sus flores llamativas y su fácil recolección, existe en los herbarios un gran número de pliegos de representantes de *Lonicera* y muchos de ellos están identificados con el nombre de *L. pilosa*. El estudio detallado de estos ejemplares nos permite deducir que bajo este nombre pueden encontrarse varios taxones fuertemente relacionados que forman un grupo taxonómico caracterizado por presentar flores del largo de las bracteólas y el cáliz cerca de la mitad del largo del ovario, corola de 4-5 cm de largo y estambres incluso a ligeamente exertos. Con el propósito de clarificar esta situación y en espera de contribuir al mejor conocimiento de este complejo se presenta el siguiente trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron cerca de 300 ejemplares (un poco más de la tercera parte son duplicados) depositados en los herbarios ANSM, CHAPA, CIIDIR, ENCB, MEXU y las bases de datos de ASU, IEB, TEX y XAL (Thiers, continuamente actualizado), en los cuales se encuentran las colecciones más representativas del género en el país. La revisión se realizó con el fin de registrar su distribución, así como analizar y comparar la variación morfológica del grupo, para posteriormente llevar a cabo la

medición y captura de los caracteres seleccionados para el estudio. Con el propósito de analizar las similitudes existentes entre los ejemplares del complejo de *Lonicera pilosa*, se realizó un análisis multivariado de escalamiento multidimensional con el método de Distancia Euclideana (Johnson y Wichern, 2007) en una Matriz de Coeficientes Gower, con base en caracteres morfométricos. Este análisis permite mostrar las relaciones de semejanza (proximidad) de los taxa a través de la representación gráfica de relaciones complejas mediante una configuración de puntos (Linares, 2001).

Previamente la matriz de datos se sometió a una correlación con ETA (nominal por intervalo) en el programa SPSS 17 (Meulman y Heiser, 2010). El coeficiente ETA indica la correlación entre variables cuantitativas y categóricas (De la Fuente-Fernández, 2011). Dado que los valores de correlación fue alta (cercana a 1) se transformaron los datos a coeficientes Gower, lo cual permite determinar el grado de semejanza entre individuos a los cuales se le han medido características cualitativas, cuantitativas (continuas y discretas) y binarias, con el uso del programa R (Gower, 1967; Chauza-López y Villa-Villada, 2011).

Para el análisis se examinaron 152 muestras de herbario disponibles (no se incluyeron duplicados, muestras incompletas o deterioradas), representativas de la diversidad morfológica del grupo y enumeradas como OTUs (Operational Taxonomic Units). Se seleccionaron 19 caracteres categóricos y 19 cuantitativos continuos, considerados de valor informativo (Cuadro 1). Los datos fueron analizados con el método de correlación utilizando el programa Minitab 16 (Greenacre, 2007). Las correlaciones fueron calculadas por Distancias Euclidianas en el programa SPSS 20.

Como parte del tratamiento taxonómico se construyó una clave para identificar los taxones. Se elaboraron descripciones morfológicas completas de las especies y especificaciones diagnósticas de las variedades, además de proporcionar información sobre el hábitat, floración y distribución de los taxones.

RESULTADOS

El agrupamiento de los ejemplares analizados guarda relación con la distribución geográfica. En la Figura 1 se observan tres grupos distintos, los dos de la izquierda, que muestran con mayor relación, son dos agrupaciones de *Lonicera pilosa*. Un tercer grupo ubicado en la parte derecha de la figura representa a una entidad diferente, que corresponde a *L. cerviculata* S. S. White (White, 1947), con distribución en el extremo septentrional de la Sierra Madre Occidental. *Lonicera pilosa*

Cuadro 1. Caracteres y estados de carácter empleados en el análisis de similitud.

1. Largo del pecíolo.
2. Forma de la hoja: 0 = oblonga, 1= elíptica.
3. Largo de la hoja.
4. Ancho de la hoja.
5. Proporción entre largo y ancho de la hoja.
6. Ápice de la hoja: 0= obtuso, 1= redondeado.
7. Base de la hoja: 0= obtusa, 1= redondeada.
8. Textura de la hoja: 0= herbácea, 1= coriácea.
9. Indumento del envés de la hoja: 0=glabro a escasamente pubescente. 1=densamente pubescente.
10. Hojas perfoliadas: 0= presentes, 1= ausentes.
11. Largo de las hojas perfoliadas.
12. Ancho de las hojas perfoliadas.
13. Largo de la inflorescencia.
14. Ancho de la inflorescencia.
15. Largo del pedúnculo.
16. Largo del cáliz.
17. Indumento del tubo del cáliz: 0=glabro, 1= piloso y glandular.
18. Indumento de los lóbulos del cáliz: 0=glabro, 1=piloso y glandular.
19. Largo del tubo del cáliz.
20. Largo de los lóbulos del cáliz.
21. Forma de la corola: 0= tubular, 1= campanulada.
22. Indumento externo de la corola: 0= ausente, 1= piloso.
23. Indumento interno de la corola: 0= ausente, 1= piloso.
24. Largo de la corola.
25. Ancho de la corola en la base.
26. Ancho de la corola cerca el ápice.
27. Forma de los lóbulos de la corola: 0= elípticos, 1= oblongos.
28. Largo de los lóbulos de la corola.
29. Ancho de los lóbulos de la corola.
30. Giba en el tubo de la corola: 0= ausente, 1= presente.
31. Ensanchamiento cerca de la base del tubo de la corola: 0= ausente, 1= presente.
32. Posición de los estambres: 0= exertos, 1= inclusos.
33. Color de la corola: 0= anaranjado-rojizo, 1= rojo-púrpura.
34. Largo del fruto.
35. Ancho del fruto.
36. Altitud: 0= 1300-1250 m, 1= 1251-3000 m.
37. Latitud: 0= 16°-22.5° N, 1= 22.6°-29° N.
38. Longitud: 0= 92°-100° W, 1= 101°-109° W.




Fig. 1. Gráfica que muestra la agrupación de los representantes del complejo *Lonicera pilosa*. L.c. (*Lonicera cerviculata*), L.p.p. (*L. pilosa* var. *pilosa*), L.p.g. (*L. pilosa* var. *glabra*).

está formada por dos variedades, la típica con una distribución en el oriente, centro y sur del país y otra, aquí propuesta, que se distribuye en el centro y occidente del territorio nacional.

Lonicera cerviculata se conoce, hasta ahora, solo de la región montañosa occidental de Chihuahua y su colindancia con Sonora. La variedad típica de *L. pilosa* está registrada hasta ahora de 15 estados del país, en tanto que la nueva variedad se localiza en la Faja Volcánica Transmexicana y en la Sierra Madre Occidental, con representación en 11 entidades del país (Fig. 2). Reconocemos en este trabajo tres taxones para el complejo, todos ellos endémicos de México.

Clave para la separación de taxones del complejo *Lonicera pilosa*.

1. Tubo de la corola ensanchado cerca de la base; corola rojiza, con tintes púrpura-anaranjados, 15-24 mm de largo, glabra internamente; estambres inclusos
..... *L. cerviculata*

1. Tubo de la corola con una giba basal; corola anaranjada, rojiza-anaranjada a amarillenta, de 30-50 mm largo, pilosa internamente; estambres ligeramente exsertos (*L. pilosa*).
2. Pedúnculo, cáliz y corola con pubescencia pilosa y de pelos glandulares; cuello del cáliz de 0.5-1.0 mm de largo *L. pilosa* var. *pilosa*
2. Pedúnculo, cáliz y corola, glabros; cuello del cáliz de 1.5-2.0 mm de largo
..... *L. pilosa* var. *glabra*




Fig. 2. Distribución conocida de las especies del complejo *Lonicera pilosa*. Estrellas (*L. cerviculata*), cuadriculado (*L. pilosa* var. *pilosa*) y blanco (*L. pilosa* var. *glabra*).

Lonicera cerviculata S. S. White, J. Arnold Arb. 28: 441. 1947. Tipo: MÉXICO. Sonora, Las Tierritas del Temblor, Sierra El Tigre, region of the Rio de Bavispe, 18 ago. 1940, S. S. White 3422 (Holotipo: MICH!).

Arbusto semierecto a voluble, 1-5 m largo; tallos glabros a escasamente pilosos. Hojas con peciolas 2-6 mm largo, ligeramente pilosos a glabros, láminas oblon-

go-ovadas 3-12 cm largo, 18-45 mm ancho, ápice obtuso, base redondeada a cuneada, decurrente, margen entero, ligeramente involuto, las de los nudos superiores, anteriores a la inflorescencia, usualmente sésiles, en ocasiones connado-perfoliadas en la base, haz verde y glabro, envés glauco y pubescente, subcoriáceas, discoloras. Flores en espigas terminales, con 1-12 verticilos de 4-8 flores sésiles, glabros; cáliz gamosépalo, pentalobulado, ovoide, 2-3 mm largo, prolongado en un cuello de 1.0-1.5 mm, glabro, lóbulos elípticos a lanceolados, 0.8-1.2 mm largo, soldados en la base, glabros; corola gamopétala, pentalobulada, rojiza, con tintes púrpura-anaranjados, tubular a estrechamente campanulada, actinomorfa, 15-24 mm de largo, tubo ensanchado cerca de la base (Fig. 3A), lóbulos elípticos, 3-4 mm de largo, glabra interna y externamente; glándula nectarífera en la base ensanchada de la corola; estambres inclusos, filamentos glabros, anteras 4-5 mm largo; pistilo 12-18 mm de largo, estilo glabro, estigma subcapitado. Fruto globoso anaranjado-rojizo, 5-8 mm de diámetro, restos del cáliz persistentes; semillas 3-4, ovoides.

Hábitat. Orilla de arroyos, laderas rocosas, en bosques de pino-encino y de táscates en altitudes de 1400 a 2200 m.

Floración. Abril-julio.

Distribución. Norte de Sierra Madre Occidental.

Ejemplares examinados. MÉXICO. CHIHUAHUA. Between Maycoba, Sonora and Yepachic, 28°27'27" N, 108°31'10" W, 1524 m, 27 abr. 2002, *Baker 14356* (ASU); Mpio. Chihuahua, Parque Cumbres de Majalca, 2120 m, bosque de pino-encino-pastizal, 13 sept. 1997, *Estrada & Yen 7169* (ANSM); Mpio. Guachochi, Norogachi, pine-oak forest, 30 may. 1984, *Bye et al. 12817* (MEXU, TEX); Mpio. Madera, Arroyo del Pedernal, Ejido El Lago, *Rodríguez 25* (MEXU); Arroyo del Agua, *Rodríguez 341* (MEXU); Mpio. Ocampo, Parque nacional Cascada de Basaseachic, 28°10' N, 108°12' W, 1980 m, matorral, 4 oct. 1986, *Spellenberg 8842* (MEXU), *11859* (MEXU); Basaseachic falls area, along river, juniper woods, 1950 m, 9 jun. 1976, *Pinkava 13266* (ASU); 24 mi up Tinaja rd., Sierra La Brena on Sierra Madre Occidental, *Pinus-Quercus* wood, 8 jul. 1998, *Spencer 680* (TEX); 12 mi E of Pacheco, Sierra La Brena on Sierra Madre Occidental, 30°05' N, 108°21' W, 2057 m, 10 jun. 1998, *Spencer 692* (ASU); 31 mi of Mata Ortiz, south of Pacheco, Sierra La Brena, Sierra Madre Occidental, 30°22' N, 108°22' W, 24 sept. 1988, *Spencer 1092* (TEX); Mpio. San Pablo Balleza, 2 km al SW de Agostadero de Aguirre, *Cota 7179*

(MEXU, XAL); Mpio. Temosachi, Nabogame, 28°29' N, 108°28' W, 1800 m, oak woodland, 5 may. 1987 *King* 426 (TEX); Nabogame, 28° 30' N, 108°30' W, 1800 m, oak woodland, 21 ago. 1987, *Laferrière* 426 (ANSM, MEXU), 912 (ANSM, MEXU, TEX), 1665 (CHAPA). DURANGO: Mpio. Canelas, Cuevecillas, cercanía al campamento de la UCODEFO “ Topia”, 2680 m, bosque de pino-encino-abeto, 26 sept. 1990, *Bravo* 1593 (ANSM, CIIDIR, MEXU); SONORA: N end of Mesa Campanero, Barranca El Salto, 28°21' N, 109°01' W, 21 jul. 1994, *Fishbein et al.* 1714 (MEXU, TEX); 1.4 km W of restaurant Puerto de la Cruz on Mex 16, N of Mesa del Campanero, matorral, 26 may. 2004, *Van Devender & Reina* 565 (MEXU).

Lonicera pilosa (Willd. ex Kunth) Spreng., Syst. Veg. 1: 178. 1825. *Caprifolium pilosum* Willd. ex Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 3: 427. Tab. 298. 1818. Tipo: MÉXICO. Hidalgo, *A. Humboldt & A. Bonpland s. n.*

= *Lonicera tubulosa* Benth., Pl. Hartw. 37. 1840. Tipo: MÉXICO. Hidalgo, Velasco, near Real del Monte. *K.T. Hartweg* 292 (Holotipo: E!; isotipo: LD!). *L. pilosa* (Willd. ex Kunth) Spreng. forma *tubulosa* (Benth.) Rehder, Ann. Rep. Mo. Bot. Gard. 14: 172. 1903. = *L. pilosa* (Willd. ex Kunth) Spreng. forma *schaffneri* Rehder, Ann. Rep. Mo. Bot. Gard. 14: 172. 1903. Tipo: MÉXICO. San Luis Potosí, chiefly in the region of San Luis Potosi, 22° N, 6000-8000 ft., *C.C. Parry & E. Palmer* 297 (Sintipos: MO!, PH); *J.W. Schaffner* 363 (Sintipos: MO, MICH); *Ghiesbreght* 699 (Sintipo: MO).

Arbustos volubles, 4-6 m largo; tallos glabros a pilosos y con pubescencia glandular. Hojas con peciolas 3-12 mm largo, glabros, láminas oblongas, 2-7(-10) cm largo, 20-50 mm ancho, ápice obtuso a redondeado, base redondeada, algo decurrente, margen entero, en ocasiones revoluto, raramente ciliado, el par de hojas superiores, frecuentemente connadas-perfoliadas hasta la mitad de la lámina, haz glabro, envés usualmente pubescente, verde amarillento a glauco, ligeramente discoloras, subcoriáceas. Flores 4-8, en cimas terminales, ocasionalmente en espigas cortas, pedúnculos 2-40 mm largo, 2-4 mm ancho, glabros, brácteas, cuando presentes, foliáceas, elípticas, 8-16 mm largo; cáliz gamosépalo pentalobulado, campanulado, 2-3 mm largo, glabro o con pubescencia glandular, lóbulos deltoides, 0.8-1.2 mm largo, soldados, glabros a ciliados, o piloso-glandular; corola gamopétala pentalobulada, anaranjada, rojiza-anaranjada a amarillenta, tubular, regular, 3-5 cm largo, tubo floral con una giba en la base, lóbulos lanceolados a elípticos, 6-10 mm largo, glabra a pilosa y con pelos glandulares externamente, pilosa internamente, glándula nectarífera presente en la giba de la corola; estambres ligeramente exertos, pilosos en la base, anteras 5 mm largo; pistilo 32-55 mm de largo, glabro, estigma capitado.

Fruto globoso, rosado a rojo, 5-8 mm de diámetro, con restos del cáliz persistentes: semillas 3-4, ovadas.

Hábitat. Cañadas y lugares húmedos en bosques de pino-encino, de oyamel, mesófilos de montaña, encinares, matorrales y pastizales, en altitudes de 800 a 3200 m.

Floración. Casi todo el año.

Lonicera pilosa* (Kunth) Spreng. var. *pilosa

Flores con pedúnculo piloso, cáliz piloso con pelos glandulares, indumento escaso a denso en el tubo, siempre presente en el cuello y lóbulos, cuello 0.5-1.0 mm largo; corola pilosa y con pelos glandulares externamente (Fig. 3C), y pilosa internamente.

Distribución: Sierras Madres Oriental, Occidental y del Sur (Fig. 2).

Ejemplares examinados: MÉXICO. AGUASCALIENTES: Mpio. Calvillo, 12 km al N del Temazcal, *García 4442* (MEXU); Mpio. San José de Gracia, San José de Gracia, 23 jun. 1985, *García 2992* (IEB, MEXU); San José de Gracia, 22°08' N, 102°24' W, 8 jul. 1983, *Siqueiros 2291* (CIIDIR, IEB). CHIAPAS: Mpio. Comitán de Domínguez, carr. Teopisca-Comitán, frente a Cruz Quemada, *Chamé & Luna 20* (CHAPA, MEXU); Mpio. Chamula, Pathuitz, 16°51' N, 92°35' W, 6 jun. 1988, *Santiz 888* (CHAPA, TEX); Mpio. Ixtapa, paraje Vo'bit, 16°47' N, 92°48' W, 17 jun. 1966, *Laughlin 1092* (TEX); Mpio. San Cristóbal de las Casas, Peña María, rumbo a San Lucas, 16°41' N, 92°38' W, 2254 m, 28 jun. 1999, *Díaz 54* (ANSM); Col. Carrizal, *Mejía & Luna 432* (MEXU, XAL); Peña María, 16°41' N, 92°36' W, 2440 m, 28 jun. 1999, *Méndez 47* (ANSM); Mpio. Zinacantán, 600 m al SW de Chainatic, *Mejía & Luna 499* (MEXU). CHIHUAHUA: Along old railroad westward rancho El Ojito, 5 may 1959, *Correll & Johnston 21495* (ASU, MEXU, TEX); Majalca, 11 may. 1959, *Correll & Johnston 21770* (TEX). COAHUILA: Mpio. Arteaga, predio Santa Anita, Sierra Rancho Nuevo, 25°26' N, 100°33' W, 2703 m, bosque de pino, 10 sept. 2006, *Encina 1457* (ANSM); ladera alta de la Sierra La Veleta, Ejido Nuncio, 25°13' N, 100°18' W, 3096 m, bosque de oyamel, 12 jul. 2014, *Encina 3801* (ANSM); La Siberia, 2600 m, bosque de pino-encino, 25 jun. 1983, *Fernández 1616* (ANSM, CHAPA, CIIDIR, MEXU, TEX); Sierra La Viga, 4 mi E of Jame, 25°26' N, 100°35' W, pine forest, *Henrickson et al. 16095* (MEXU, TEX); Sierra Zapalinamé, 2990 m, 19

may. 1990, *Hinton* 20270 (CHAPA, MEXU, TEX); Los Lirios-El Cercado, pine and oak wood, 2405 m, 29 jul. 1995, *Hinton* 25425 (ANSM, TEX); Mesa de las Tablas, *Núñez* 10 (MEXU); Sierra Madre Oriental, 25°13' N, 100°28' W, 2750 m, 25 jul. 1975, *Robert & Passini* 15-43-14 (ANSM); Sierra de Arteaga, Cañón La Osamenta, 25°20' N, 100°39' W, 2300 m, bosque de pino piñonero, 26 may. 1990, *Villarreal & Carranza* 5667 (ANSM, ASU, CHAPA, CIIDIR, MEXU); Mpio. Cuatrociénegas, Sierra de La Madera, 27°02' N, 102°23' W, 20 sept. 1972, *Chiang et al.* 9425 (TEX); Sierra La Madera, Cañón La Hacienda, 27°03' N, 102°24' W, 2900 m, 5 ago. 1973, *Henrickson & Wendt* 11937 (ASU, MEXU, TEX); 6 km de Ostula, *Pinus* wood, 12 ago. 1976, *Henrickson & Pigge* 15285b (MEXU, TEX); road to San Antonio, 2853 m, Douglas fir forest, 21 abr. 1976, *Pinkava* 13569 (ASU); Sierra La Madera, Cañón El Invierno, 28 ago. 1974, *Wendt* 645 (TEX); Mpio. Ocampo, Sierra Maderas del Carmen, above Campo Cinco, 17 jun. 1976, *Fryxell* 2694 (TEX); aserradero Maderas del Carmen, 28°57' N, 102°34' W, 25 may. 1975, *Riskind* 1780 (TEX); Sierra del Carmen, E of Moreno, *Spellenberg* 9948 (MEXU); 20 km NW of Fraile, *Stanford et al.* 450 (MEXU); Sierra Maderas del Carmen, Campo Tres, S of canyon El Club and Hell's kitchen, *Wendt et al.* 484 (MEXU, TEX); Mpio. Ramos Arizpe, Sierra de la Paila, Ejido El Cedral, 1300 m, 25 ago. 1992, *Valdés* 2210 (ANSM); Sierra de La Paila, El Cedral, 26°02' N, 101°23' W, 1300 m, bosque de *Quercus*, 2 nov. 1988, *Villarreal et al.* 4952 (ANSM, MEXU), *Villarreal et al.* 4759 (ANSM); Mpio. Saltillo, Puerto San Lorenzo, 2460 m, bosque de encino, 2 ago. 1979, *Arce s. n.* (ANSM); Cañón de San Lorenzo, 25°20' N, 100°55' W, 2532 m, bosque de encino, 6 jul. 2000, *Encina* 456 (ANSM, IEB); Sierra de Zapalinamé, Cañón de Santa Rosa, 25°19' N, 100°57' W, 2427 m, bosque de encino-pino, 11 feb. 2002, *Encina* 697 (ANSM). DURANGO: Mpio. El Mezquital, Las Cuevitas por el camino a Charcos, 2020 m, bosque de *Pinus-Quercus*, 11 may. 1987, *Acevedo* 447 (ANSM, CIIDIR, MEXU); 40 km de La Escondida, 2740 m, bosque de encino-pino, 18 jun. 1992, *González* 5152 (ANSM, CIIDIR, MEXU); Mezquital, 18 jul. 1985, *González* 6263 (CIIDIR, IEB); Mpio. Guanaceví, 40-50 km al E de Guanaceví, *Hernández et al.* 8331 (MEXU); 12 km E of El Salto, 23°50' N, 105°18' W, 23 jun. 1973, *Johnston et al.* 11444 (TEX); Mpio. Pueblo Nuevo, Corralitos, 26 sept. 1982, *Fernández* 1187 (CIIDIR, IEB); El Salto, 23°39' N, 105°44' W, 15 jun. 1951, *Gentry & Gilly* 10612 (MEXU, TEX); 8-10 km al S de El Salto, *Hernández & Tenorio* 7600 (MEXU); 5 km de la desviación hacia Chavarria, *Tenorio & Romero* 6079 (MEXU); Maíz Gordo, rumbo a Pueblo Nuevo, 23°13' N, 104°56' W, 3034 m, bosque de pino-encino, 23 oct. 2010, *Vázquez et al.* 59 (ANSM); Mpio. San Dimas, Mesa del Roble, San Miguel de Cruces, 2700 m, bosque de pino-encino, 20 may. 1990, *García & Acevedo* 379 (ANSM, CHAPA,

CIIDIR, IEB, MEXU); Mesa del Roble, 26 may. 1990, *González & Acevedo* 5008 (CHAPA, CIIDIR, IEB); Mpio. Santiago Papasquiario, Santiago Papasquiario, 29 jul. 1990, *Benítez* 590 (CIIDIR, IEB); km 21 carr. Santiago Papasquiario -Los Altares, *Benítez* 1627 (CIIDIR, MEXU); 1.6 mi by Topia, 25°04' N, 105°49' W, 9 jul. 1983, *Corral* 226 (TEX); Sierra de las Candelas, 30 mi NW of Santiago Papasquiario, *Straw & Forman* 1770 (MEXU); 14 km al W de Garama de Abajo, bosque de pino-encino, 15 jul. 1982, *Tenorio & Romero* 984 (ANSM, MEXU, XAL); Mpio. Súchil, San Salvador de Ahorcados, 25 oct. 1986, *Acevedo* 95 (CIIDIR, IEB); Cerro Las Iglesias, Sierra de Urica, 7 km al E de El Alemán, Reserva de la Biosfera La Michilía, *Acevedo* 335 (CIIDIR, MEXU); Reserva de la biosfera La Michilía, 23°21' N, 104°11' W, 2400 m, bosque de *Quercus-Pinus*, 11 may. 1992, *García* 1300 (ANSM, CIIDIR); Reserva La Michilía, arroyo San Pedro, *García* 1660 (CIIDIR, MEXU); San Juan de Michis, 23°26' N, 104°07' W, 6 ago. 1981, *González y Acevedo* 1825 (CHAPA, CIIDIR, IEB, MEXU, TEX); entrada al rancho El Cordón Santo, cerca del Cerro La Zorra, *González* 3762 (CIIDIR, MEXU); Magueycitos, 20 km al SW de Rancho de Peña, *Martínez* 597 (MEXU); Magueycitos, 2 jun. 1975, *Maury et al.* 31 (CIIDIR, IEB, MEXU); Mpio. Tepehuanes, camino Tepehuanes-El Tarahumara, *Benítez* 937 (CIIDIR, MEXU); Sierra Madre Occidental, 19 mi W of Ojito, *Reveal & Hess* 3075 (MEXU). GUANAJUATO: Mpio. Dolores Hidalgo, carretera Dolores Hidalgo-Guanajuato, km 83, *Carranza* 4057 (IEB, MEXU, XAL); carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo, km 85, *Martínez* 1011 (MEXU); Mpio. Guanajuato, Cañada La Virgen, *Cano* 02 (CIIDIR, IEB, MEXU, XAL), 09 (IEB, MEXU); carretera Dolores Hidalgo-Guanajuato, km 38, *Kishler* 760 (MEXU); camino a Agua Sabrosa-Viborillas, *Martínez* 426 (MEXU); La Mesa de Hernández, Cardo Santo, *Martínez* 648 (MEXU), *Martínez* 820 (MEXU); El Ciervo, *Martínez* 959 (MEXU); Presa Peralvillo, *Zamudio & Murillo* 6387 (CIIDIR, IEB, MEXU, XAL); Santa Rosa de Lima, 5 sept. 1998, *Zamudio & Murillo* 10820 (CIIDIR, IEB, MEXU, XAL); HIDALGO: Mpio. Epazoyucan, 1 km al S de Peñas Largas, 1 sept. 1963, *Rzedowski* 30530 (ENCB, MEXU); El Guajolote, 20°06' N, 98°36' W, 17 jun. 1984, *Medina & Barrios* 2576 (ENCB, MEXU, TEX); Mpio. Zimapán, 38 km al NE, *Hernández* 3884 (MEXU); NUEVO LEÓN: Mpio. Aramberri, Cañón Los Capulines, San José de Raices, 6 ago. 1935, *Muller* 736 (MEXU, TEX); Mpio. Doctor Arroyo, 46 km al N de Doctor Arroyo, 22 jun. 1970, *Flyr* 1507 (TEX); San Antonio Peña Nevada, 24 may. 1992, *Hernández* 2735 (TEX); San Antonio Peña Nevada, 23°48' N, 99°53' W, jul. 1977, *Wells & Nesom* 368 (TEX); Mpio. Galeana, Cerro El Potosí, 20 jun. 1972, *Chiang et al.* 8062 (MEXU, TEX); 2 miles S of Pablillo, 20 jul. 1958, *Correll & Johnston* 19890 (ASU, MEXU, TEX); cima Cerro Potosí, 24°53' N, 100°12' W, 12

may. 1982, *Dorr & Atkins* 2299 (MEXU, TEX, XAL); San Pedro Sotolar, pine oak wood, 31 may. 1983, *Dorr et al.* 2646 (MEXU, TEX, XAL); camino Los Mimbres a San Rafael, 1950 m, matorral, 30 jun. 1991, *Estrada et al.* 2045 (ANSM); 4 km al N del ejido Cieneguillas, bosque de *Pinus cembroides*, 12 jul. 1979, *Flores s.n.* (ANSM); Cerro El Potosí, clearing in mixed forest, 3190 m, 22 jun. 1969, *Hinton* 17127 (TEX); Cerro El Voladero, 3 jul. 1984, *Hinton* 17249 (TEX); Pablillo, 5 may. 1983, *Hinton* 17370 (CHAPA, IEB, MEXU); El Potosí, 22 jun. 1969, *Hinton* 18724 (TEX); Cerro El Potosí, open forest, 8 jul. 1963, *McGregor* 341 (TEX); 15 mi SW of Galeana, 15 jun. 1934, *Muller* 800 (MEXU, TEX), *Muller* 2398 (MEXU, TEX); camino del ejido 18 de Marzo al Cerro del Potosí, *Yané & McDonald* 224 (MEXU); Pablillo, 28 may. 1969, *Seigler* 1364 (TEX); áreas cercanas a Pablillo, 24°30' N, 100°05' W, 2100 m, bosque de pino piñonero, 12 jun. 1985, *Villarreal et al.* 3034 (ANSM, CIIDIR, MEXU, TEX); San José de la Marta, 25°10' N, 100°15' W, 1900 m, bosque de pino piñonero, 7 junio 1988, *Villarreal* 4328 (ANSM, TEX); Mpio. Montemorelos, El Butano, 2000 m, bosque de coníferas, 3 jun. 2004, *Estrada et al.* 16344 (ANSM); Mpio. Rayones, cima de la Sierra de la Marta, 25°09' N, 100°23' W, 3400 m, bosque de *Pinus hartwegii*, 19 may. 1995, *Villarreal et al.* 8132 (ANSM); Mpio. Zaragoza, Cerro El Viejo, oak and pine wood, 2380 m, 29 jul. 1993, *Hinton* 23262 (IEB, TEX); Cerro el Viejo, 2400 m, Cedar forest, 4 ago. 1993, *Hinton* 23320 (ANSM, IEB, TEX); Cañada La Tinaja, 23°56' N, 99°49' W, 3 july 1988, *Patterson* 5776 (TEX). OAXACA: Mpio. San Miguel del Puerto, Llano del Horno, *López* 141 (MEXU). PUEBLA: Plantas del parque estatal General Lázaro Cárdenas, *Martínez* 365 (MEXU), 718 (MEXU). QUERÉTARO: Mpio. Cadereyta, alrededores de El Doctor, *Hernández et al.* 11019 (MEXU); alrededores de Chavarría, *Huerta* 1505 (MEXU, XAL); 3 km al S de Chavarrías, 2800 m, bosque de pino piñonero, 19 jul. 1990, *Zamudio* 7929 (ANSM, IEB, MEXU); Chavarría, Sierra El Doctor, *Zamudio & Carranza* 6433 (IEB); Mpio. Jalpan, 4-5 km al poniente de La Parada, *Servín* 325 (IEB, MEXU); Mpio. Landa, 1 km al SW de El Sabinito, *Rubio* 1158 (CIIDIR, IEB, XAL); 1.5 km al NE de El Sabinito, *Rubio* 1243 (IEB); 1.5 km al SE de La Yesca, *Rubio* 2418 (IEB); 6-7 km al NE de Lagunita de San Diego, *Rubio* 2577 (IEB, MEXU); Mpio. Pinal de Amoles, al SW de El Madroño, *Carranza* 2694 (IEB); Mpio. San Joaquín, Campo Alegre, *Fernández* 3296 (IEB, TEX). SAN LUIS POTOSÍ: Mpio. Charcas, Sierra de Monte Grande, *Reyes* 823 (CHAPA); Sierra de Monte Grande, ladera Norte, *Reyes* 917 (CHAPA); Ex convalli San Luis Potosí, *Schaffner* 733 (MEXU); TAMAULIPAS: Mpio. Gómez Farías, El Paraiso, Rancho El Cielo, *González et al.* 7502 (ANSM, MEXU); rancho El Julilo, 1800 m, bosque caducifolio, 25 sept. 1974, *González et al.* 7503 (ASU, MEXU); El Paraiso, 7 km al

W del Rancho El Cielo, *González et al.* 7504 (ANSM, MEXU); Mpio. Jaumave, 15 km al N de Julilo, *González & Martínez* 3661 (MEXU); Mpio. Miquihuana, 17 km al NE de La Peña, *González et al.* 7051 (MEXU). ZACATECAS: Mpio. Genaro Codina, carr. Guadalupe-Pabellón, km 80, *Balleza* 16802 (MEXU); Sierra del Astillero, Tanque El Alto, 24°34' N, 101°04' W, 2 jul. 1973, *Johnston et al.* 11553 (MEXU, TEX).

Lonicera pilosa (Kunth) Spreng var. **glabra** Villarreal, A. E. Estrada & A. D. Ruíz, var. nov. Tipo: MÉXICO. Durango, municipio de Mezquital, Ojo de Agua, 20 km de La Escondida por el camino a Los Charcos. 18.06.85. *S. González et al.* 1755 (Holotipo: MEXU; isotipos: ANSM, CIIDIR, CHAPA).

Similar to *Lonicera pilosa* but flowers with peduncles and calyxes glabrous; calyx neck 1.5-2.0 mm long; corolla externally glabrous, internally pilose.

Flores con pedúnculo y cáliz glabros; cáliz con cuello 1.5 a 2.0 mm largo; corola glabra externamente y pilosa internamente (Fig. 3B).

Distribución: Sierra Madre Occidental y Faja Volcánica Transmexicana (Fig. 2).

Ejemplares examinados: MÉXICO. CHIHUAHUA: Mpio. Guachochi, Norogachi, 15 jul. 1955, *Pennington* 195 (TEX); Llano Grande, 23 may 1960, *Pennington* 586 (TEX); Mpio. Guazapanes, on slope E and above Las Lagunitas, barranca de Chinipas, *Bye* 6581 (MEXU); La Ciénega, 19 jul. 1965, *Pennington* 64 (TEX); Mpio. Madera, arroyo La Quinta, ejido El Largo, 2100 m, bosque de pino-encino, 13 oct. 1990, *Benítez* 2851 (ANSM, CIIDIR, IEB, MEXU); arroyo Las Garrochas, Ejido El Largo, 2600 m, 2 jul. 1990, *Bravo* 921 (ANSM, CIIDIR, IEB, MEXU); 29 km E of Yepachic along road to Chihuahua, *Breedlove* 61212 (MEXU); Cerro Mohinora, 10 miles S of Guadalupe y Calvo, *Straw & Forman* 2038 (MEXU); Mpio. Ocampo, Basaseachi, 26 sept. 1986, *Torres & Tenorio* 3810 (MEXU, TEX). DISTRITO FEDERAL: Del. Álvaro Obregón, Sector Limbo, *Ventura* 2666 (MEXU); San Bartolo, 2700 m, matorral, 25 abril 1977, *Ventura* 2698 (ASU, ENCB, MEXU); Santa Rosa, *Ventura* 2817 (IEB, MEXU), 2718 (ASU, CHAPA, MEXU); Del. Cuajimalpa, Los Gavilanes, *Cesar & Rivera* 298 (MEXU); Desierto de Los Leones, 19°19' N, 99°18' W, 23 mar. 1991, *Chávez s.n.* (ANSM); Desierto de Los Leones, *Lyonnet* 1125 (ENCB, MEXU), 2135 (CHAPA, MEXU), 3077 (IEB, MEXU); Desierto de Los Leones, *Paray* 491 (ENCB, MEXU); Thickets near Eslava, *Pringle* 9380 (MEXU),

13009 (MEXU); Desierto de Los Leones, Sabandijas, *Rivera* 4122 (MEXU); W of la Marquesa in Desierto de Los Leones, *Wonderly* 203 (MEXU); Del. Magdalena Contreras, Cañada de Contreras, *Rivera et al.* 3931 (MEXU); Del. Tlalpan, Pedregal de San Ángel, cerca de San Ángel, matorral, 27 de oct. 1966, *Diego* 1200 (ENCB, XAL); Panteón Jardín, *Ulloa s. n.* (MEXU). DURANGO: paraje Arroyo Boscoso, 1 km antes de El Tarahumara, *Benítez* 470 (CIIDIR, MEXU); Mpio. Canelas, Cuevecillas, 26 sept. 1990, *Bravo* 30 (CIIDIR, IEB, MEXU); Route 40, ca 9 km E of El Salto, *Cruden* 1304 (MEXU); Mpio. Mezquital, 3 km al W de Santa María Ocotlán, bosque de pino, 15 ago. 1984, *González* 1409 (ANSM, CIIDIR, MEXU); Ojo de Agua, 20 km de La Escondida, 2719 m, bosque de pino-encino, 18 jun. 1985, *González et al.* 1755 (ANSM); 8 km de La Guajolota, bosque de encino, 29 jul. 1985, *Solís* 41 (CHAPA, IEB), *Solís* 57 (ANSM, CIIDIR); La Guajolota, 22°57' N, 104°37' W, 29 jul. 1985, *Solís* 916 (CHAPA, CIIDIR, IEB); Mpio. Nuevo Ideal, Sierra de Coneto, 24°55' N, 104°46' W, 2280 m, bosque de *Pinus-Quercus*, 25 may. 2002, *López et al.* 121 (ANSM, CIIDIR, MEXU); Hacienda Coyotes, 63 road miles W-SW of Durango, *Maysilles* 7485 (MEXU); *Mendía* 14 (CIIDIR); Mpio. Pueblo Nuevo, Corralitos, 23°25' N, 105°22' W, 26 sept. 1982, *Fernández* 1224 (CIIDIR, IEB); alrededores del Mil diez, 2 km al NW de El Salto, *Hernández & Tenorio* 7505 (MEXU); 46 km de la desviación a San Miguel de Cruces, *Hernández et al.* 7745 (MEXU); Mpio. Santiago Papasquiaro, Garamé, 26 km al W de Santiago Papasquiaro, 1800 m, bosque de pino piñonero, 15 jul. 1982, *Hernández et al.* 7910 (ANSM, MEXU), 7923 (MEXU, XAL). JALISCO: Mpio. Ayutla, 19 km WSW de La Ferrería, 19°57' N, 104°28' W, 1800 m, 12 ago. 2012, *Carrillo & Monroy* 6739 (ANSM); Mpio. Tecatitlán, La Resbalosa, *Pichardo* 122 (CHAPA); 7 mi W of Tecatitlán, *Rodman & Schnell* 10 (MEXU); Mpio. Toluimán, El Timbre, cerca de Picachos, Cerro Grande, *Sánchez & Cruz s.n.* (MEXU); Camino del Tuito a Tlapa, después de la mina, *Téllez* 6814 bis (MEXU, XAL). MÉXICO: Mpio. Huixquilucan, ladera húmeda en bosque abierto, *Matuda* 21570 (MEXU); Mpio. Jilotepec, encinar cercano a Coscomate, *Villaseñor* 06 (MEXU); Mpio. Jilotzingo, Cerro Ñadó, al N de San Luis Ayucan, *Rzedowski* 33988 (ENCB, MEXU); Cerro Venacho, al E de Amecameca, *Rzedowski* 33972 (MEXU); San Francisco Acuatla, *Urbina s.n.* (MEXU); Mpio. Nicolás Romero, Colonia Libertad, 2300 m, matorral, 21 oct. 1978, *Ventura* 3363 (ASU, ENCB, MEXU, XAL); Mpio. San Felipe del Progreso, orilla de arroyo, *Matuda* 19742 (MEXU); San Luis Ayucan, *Matuda et al.* 28289 (MEXU); Barranca Papaloaque, bajando a San Rafael, *Miranda* 261 (MEXU); Mpio. Temascaltepec, Cajones, 22 may. 1933, *Hinton* 3867 (ASU, DES); La Cumbre, Gavia Chica, 12 abr. 1936, *Hinton et al.* 9010 (TEX); Mpio. Texcoco, 9 km al SE de Tequexquahuac,

brecha a la cima del Cerro Tlaloc, *Charles & Perino 3433* (CHAPA); Sierra Tlaloc, *García 1795* (CIIDIR, MEXU, TEX); San Pablo Ixyoc, *Hahn 552* (MEXU); Cerro Tlaloc, *Koch & Koch 9512* (CHAPA); Texcoco, 9 km al S de Tequexquinahuacan, Cerro Tlaloc, *Perino 3433* (CHAPA, ENCB); Santa Catarina del Monte, 8 jun. 1985, *Ventura 4413* (ENCB, IEB, MEXU, TEX); Mpio. Valle de México, Cerro de León, *Matuda 19120* (MEXU). MICHOACÁN: Mpio. Nahuatzen, Cerro Pelón, 6 dic. 1985, *Martínez 410* (MEXU, IEB); salida poniente de Sicuicho, *Motte 240* (MEXU); MORELOS: Parque Nacional Lagunas de Zempoala, *Smith 51* (MEXU); Lagunas de Zempoala, *Vázquez 3217* (MEXU). NAYARIT: Mpio. Acaponeta, La Cienega, 10 mi. NW of Mesa del Nayar, *Norris & Taranto 14608* (MEXU). SINALOA: Mpio. Concordia, 50 km al NE de Concordia, carr. Mazatlán-Durango, *Ortiz et al. 270* (MEXU); El Palmito, *Vega 1426* (CHAPA, MEXU). SONORA: Mesa El Campanero, Arroyo Largo, *Van Devender et al. 410* (MEXU); Mpio. Yécora, Mesa El Campanero, barranca El Salto, 14 jul. 1997, *Van Devender 97-701* (TEX). ZACATECAS: Mpio. Teul de González Ortega, alrededores del Puente sobre el Río Patitos, 21°21' N, 103°33' W, 1700 m, 27 may. 2015, *Carrillo & Ramírez 7818* (ANSM).




Fig. 3. Detalle de las flores en A. *Lonicera cerviculata*, B. *L. pilosa* var. *glabra*, C. *L. pilosa* var. *pilosa*. Ilustrado por Gabriel Gloria.

AGRADECIMIENTOS

A los curadores de los herbarios citados y a los revisores anónimos. Al M.C. Félix Sánchez Pérez por su ayuda con el análisis estadístico. Por el apoyo financiero otorgado por el CONACYT, a través de la beca 545819 a la estudiante Alma D. Ruíz A., y por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante el proyecto 3614-2108, titulado Plantas endémicas y raras de Coahuila.

LITERATURA CITADA

- Chauza-López, L. J. y E. A. Villa-Villada. 2011. Análisis de Conglomerados Comparando el Coeficiente de Similitud de Gower y el Método Análisis Factorial Múltiple para el Tratamiento de Tablas Mixtas. Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Santiago de Cali, Colombia. 72 pp.
- De la Fuente-Fernández, S. 2011. Tablas de Contingencia, Análisis de Variables Categóricas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España. 52 pp.
- Gower, J. 1967. A comparison of some methods of Cluster Analysis. *Biom. J.* 23: 623-637.
- Greenacre, M. 2007. Correspondence analysis in practice. Second edition. Chapman & Hall. London, U.K. 311 pp.
- Johnson, R. A. y D. W. Wichern. 2007. Applied Multivariate Statistical Analysis. Sixth edition. Prentice-Hall. New Jersey, USA. 767 pp.
- Linares, G. 2001. Escalonamiento Multidimensional: conceptos y enfoques. *Rev. Inv. Oper.* 22(2): 173-183.
- Meulman, J. J. y W. J. Heiser. 2010. IBM SPSS Categories 19. SPSS Inc. Chicago, USA. 318 pp.
- Rehder, A. 1903. Synopsis of the genus *Lonicera*. *Ann. Rep. Mo. Bot. Gard.* 14: 27-232.
- Theis, N., M. J. Donoghue y J. Li. 2008. Phylogenetics of Caprifoliaceae and *Lonicera* (Dipsacales) based on nuclear and chloroplast DNA sequences. *Syst. Bot.* 33(4): 776-783.
- Thiers, B. Continuously updated. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. <http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>.
- Villarreal-Quintanilla, J. A. 2000. Caprifoliaceae. Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes 88: 1-16.
- White, S. S. 1947. New plants from northeastern Sonora, Mexico and notes on extensions of range. *J. Arnold Arb.* 28: 439-441.

Recibido en febrero de 2015.

Aceptado en enero de 2016.